



DORDENTE

I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: DORDENTE

Nome genérico: cloridrato de procaína, fenol

APRESENTAÇÃO

Solução tópica contendo 8 mg/mL de cloridrato de procaína e 0,008 mL/mL de fenol: Flaconete com 3 mL.

USO TÓPICO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL da solução contém: 8 mg de cloridrato de procaína e 0,008 mL de fenol.

Excipientes: essência de cravo, mentol, sacarina sódica, álcool etílico.



II- INFORMAÇÕES AOS PACIENTES:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

DORDENTE é indicado como anestésico local na dor de dente causada por cárie.

2. COMO ESSE MEDICAMENTO FUNCIONA?

DORDENTE, quando aplicado na dentina, bloqueia a condução nervosa aliviando a dor, pela ação anestésica da procaína. O fenol apresenta propriedade bactericida, promovendo ação desinfetante e antisséptica da superfície cariada.

A ação de DORDENTE ocorre dentro de poucos instantes após a aplicação local.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar DORDENTE se tiver alergia aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Podem ocorrer reações de queimação na boca e na garganta, além de hipersensibilidade local.

Atenção: Contém álcool (etanol).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

DORDENTE é uma solução límpida, levemente amarelada com odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Seque o dente afetado com algodão, umedeça outro algodão com DORDENTE e aplique suavemente no local. Não ingerir o medicamento.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Podem ocorrer reações de queimação na boca e na garganta, irritação local.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. Informe também à empresa através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).



8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Os sintomas observados na superdosagem são queimações intensas na boca, garganta, esôfago e estômago; salivação excessiva e vômitos.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III – DIZERES LEGAIS

Registro: 1.0570.0050

Farm. Resp.: Reginaldo Fernandes – CRF-RJ nº 14.293

Registrado e Produzido por:

Hearst Laboratórios do Brasil Ltda.

Av. Actura, 100, Campos Elíseos

Duque de Caxias, RJ, CEP 25.225-210

CNPJ 28.634.665/0001-76

Indústria Brasileira

SAC 0800 878-0176 / sac@hearst.com.br

www.hearst.com.br

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 20/07/2026.

Rev: 06